

EL INFARTO

Justificación

En 1948 Framingham comenzó a investigar sobre el infarto femenino. ¿Sabías que es la principal causa de muerte entre las mujeres en España y en muchos otros países occidentales? Las investigaciones hasta entonces siempre se habían realizado con hombres y los síntomas son distintos en ambos casos. En los hombres se produce un dolor intenso en el pecho que se refleja en el brazo izquierdo y en el cuello, mientras que en las mujeres se produce un dolor en el omóplato, en la mandíbula y problemas digestivos.



Por ello el 40% de las mujeres que sufren infarto mueren frente al 25% de hombres, ya que en las carreras de enfermería y medicina se siguen estudiando los síntomas masculinos. Cuando una mujer llega a un hospital con un infarto no es tratada adecuadamente, ya que se la trata como a un hombre cuando su cuerpo es distinto.

Desarrollo

Con esta actividad vamos a conocer algunas desigualdades que se han dado en la medicina a lo largo de la historia.

1. ¿Qué es el infarto?
2. Busca dos sinónimos de este concepto.
3. Completa la tabla de los síntomas del infarto.

| Mujeres | Hombres |
|---------|---------|
| | |

4. ¿Afecta de la misma forma a hombres y mujeres el tratamiento con la aspirina para el infarto?
5. ¿Por qué piensas que los estudios se realizan en su mayoría solo con hombres?